

Nya exotiska Epeirider. — Herr Docenten T. THORELL hade meddelat följande uppsats:

NEPHILA LEACH.

1. *N. fenestrata*. — Long. 22—28 millim. (♀).

Picea, pedibus unicoloribus, tibiis 1:mi, 2:di et 3:tii paris totis dense nigro-villosis, cephalothorace argenteo-piloso, bituberculato, abdomine oblongo, sub-cylindrato, virescenti-fusco, colore ventris nigro lineis et vittis flavis in areas sub-rectangulas divisio. — ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

2. *N. annulata*. — Long. 27—33 millim. (♀).

Nigro-picea, pedibus testaceo-annulatis, tibiis 1:mi et 2:di paris ad partem, 4:ti totis longius nigro-pilosis, cephalothorace bituberculato, argenteo-piloso, abdomine elliptico-cylindrato, fusco, maculis et fasciis argenteo-pilosis, ventre nigro-fusco, vittis duabus transversis, interdum abruptis, flavis. — ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

3. *N. lineata*. — Long.?

Testacea, tibiarum 1:mi et 2:di paris annulo fusco cum tibiis 4:ti paris longius nigro-piloso, cephalothorace vitta utrinque fusca, argenteo-piloso; abdomine cylindrato, supra testaceo, area postica fusca, lineis maculisque argenteis ornato, ventre nigro, linea utrinque testacea. — ♀ jun., 9 millim. longa.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

ARGYOPE SAV.

1. *A. avara*. — Long. 18—25 millim. (♀).

Fusca vel testacea, cephalothorace dense argenteo-piloso, pedibus subunicoloribus; abdomine ob-ovato, integro, supra flavo-testaceo, postice transverse nigro-fasciato, ventre nigro, fasciis duabus ad longitudinem maculisque quattuor in trapezium dispositis flavis. — ♀ ad.

Patria: *California* (*S. Francisco*) et Oahu (*Honolulu*), KINBERG.

2. *A. opulenta*. — Long. ca 15 millim. (♀).

Testacea, cephalothorace macula utrinque fusca, dense argenteo-piloso, pedibus fusco-annulatis; abdomine ob-ovato, integro, supra flavo-testaceo, vittis tribus latis argenteis sinuatis, antice in plagam transversam coeuntibus, maculisque transversis flaventibus, nigro-marginatis ventre atro, vittis duabus ramosis ad longitudinem ductis flavis. — ♀ ad.

Patria: *Java*, MELLERBERG.

3. *A. elegans*. — Long. 12—16 millim. (♀).

Ferrugineo-testacea, cephalothorace albicanti-piloso, pedibus fusco-annulatis; abdomine ob-ovato, integro, humeris acuminatis, supra

fusco, vittis tribus transversis aureis, quarum prima, reliquis latior, linea fusca geminatur; ventre nigro, fascia utrinque flava, e maculis, quarum media transversa est, formata, paribusque tribus punctulorum aurcorum in medio antice. — ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

4. *A. manicata*. — Long.?

Fusca, cephalothorace fusco-testaceo, vitta transversa fusciori, argenteo-piloso, pedibus fuscis, metatarsis tarsisque testaceis; abdomine ovato-sub-pentagono, integro, humeris angulatis, supra sub-cinereo, area dorsi postice fusciori, ventre nigricanti, fasciis duabus flaventibus. — ♀ jun., 4 millim. longa.

Patria: *China (Hongkong)*, KINBERG.

5. *A. lata*. — Long. c:a 21 millim. (♀).

Testacea, cephalothorace dense argenteo-pubescenti, pedibus fusco-annulatis; abdomine lato, depresso, rotundato-pentagono, utrinque in lacinias crassas inciso, supra flavo-testaceo, argenteo-piloso, maculis denudatis in tres series dispositis, ventre fusco-et testaceo-variegato. — ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

6. *A. nigro-vittata*. — Long. c:a 19 millim. (♀).

Nigro-fusca, cephalothorace argenteo-pubescenti, palpibus et pedibus testaceis, his dense nigro-annulatis; abdomine brevi, depresso, hexagono-rotundato, lateribus exciso-laciniatis, supra albicanti, fasciis transversis nigris, argenteo-pilosis, ventre fusco, testaceo-maculato. — ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

7. *A. cuspidata*. — Long. c:a 25 millim. (♀).

Testacea, cephalothorace albicanti-villoso, pedibus nigro-annulatis; abdomine sub-pentagono, humeris acuminatis, postice 5-cuspidato, supra cinereo-albicanti, vitta ante tubercula humeralia transversa, nigra: subtus versus latera virescenti, fusco-maculato, in medio nigricanti, fasciis duabus punctisque flavis.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

ACROSOMA PERTY.

1. *A. forcipatum*. — Long. cum corn. abd. c:a 14 millim. (♀).

Rufescenti- et fusco-testaceum, summo partis thoracicae margine albo, pedibus testaceis; abdomine sub-triangulari-pyramidato, postice latiore, antice posticeque truncato, aculeis lateralibus sex, cornibusque duobus, longitudine fere corporis, crassis, medio angustatis, oblique sub-clavatis, apice mucronatis, paullo ante et supra aculeos duos posticos sitis. — ♀ ad.

Patria: *Cuba*.

2. *A. bovinum*. — Long. 7—8 millim. (♀).

Rufescenti-testaceum, parte thoracica versus margines nigricanti, ipso margine flaveri; abdomine sub-triangulari-pyramidato, antice posticeque truncato, postice latiore, latitudine postica paullo longiore, supra flavo, aculeis duabus majoribus pone humeros dorsualibus, duabus aliis minutis in margine pone medium, cornibusque duobus crassissimis, longitudine cephalothoracis, rectis, acuminatis, nigris, basi late rubris, in angulis lateralibus posticis sitis. — ♀ ad.

Patria: *Alabama*.

3. *A. stelligerum*. — Long. ca 8 millim (♀).

Ferrugineo-rubrum, abdomine nigro, flavo-maculato, quadrato-pentagono, spinis quinque rubris: 4 majoribus, divaricantibus, stellam quadri-cuspidem referentibus, 5:ta iis duplo minori, terminali. — ♀ ad.

Patria ignota.

GASTERACANTHA LATR.

1. *G. vaccula*. — Long. ca 8 millim. (♀).

Rufescenti-fusca, abdomine transverso, cornibus duobus posticis magnis, curvatis, sub-parallelis, libratis, aliisque cornibus antice in lateribus; dorso flaveri, ocellis magnis, ferrugineis. — ♀ ad.

Patria: *Sierra Leona*, AFZELIUS.

2. *G. vittata*. — Long. 7—9 millim. (♀).

Nigra, pedibus testaceo-fuscis; abdomine latissimo, transverso, fusco, vittis transversis testaceis, spina et cornu in utroque latere appropinquantibus, illa parva, hoc magno, crasso, foras directo, sub-recurvo, spinisque duabus longioribus sub-parallelis in margine postico. — ♀ ad.

Patria: *Java*, MELLERBORG.

3. *G. varia*. — Long. ca 8 millim. (♀).

Testaceo-rubra, femoribus rubris, reliquis pedum internodiis nigris, abdomine transverse ovali, supra flavo-testaceo, in medio latere utrinque, dente parvo et cornu sat longo, sub-recurvo, appropinquantibus, libratis et foras directis, spinisque duabus fortibus sub-parallelis, libratis in margine postico armato. — ♀ ad.

Patria ignota.

4. *G. moesta*. — Long. ca 6 millim. (♀).

Nigro-picca, pedibus testaceo-annulatis, abdomine transverso, antice fortiter rotundato, spina crassissima, sub-conica, librata, foras et paullo retro directa in medio latere utrinque, duabusque aliis minoribus in margine postico. — ♀ ad.

Patria: *S. Barthelémy*.

5. *G. hilaris*. — Long. c:a 7 millim. (♀).

Rubra, pedibus nigro-annulatis; abdomine transverso, antice fortiter rotundato, supra flavo-testaceo, ocellis minutis, spina brevior, crassissima, sub-conica, ferruginea in medio latere utrinque duabusque aliis parvis in margine postico. — ♀ ad.

Patria: *S. Barthélemy*.

6. *G. ensifera*. — Long. 8—10 millim. (♀).

Rubra, pedibus extorsum nigricantibus; abdomine transverso, supra flavo-testaceo, scuto dorsuali latissimo, sub-fusiforimi, ex latere emarginato spinam medioerem et cornu longum, recurvum, divaricantia, librata, ferrugineo-rubra emittente: postice spinis duabus fortibus, sub-parallelis, ferrugineo-rubris armato. — ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

7. *G. ornata*. — Long. c:a 9½ millim. (♀).

Nigra, pedibus rubris, nigro-annulatis, abdomine transverso, sub-ovali, scuto dorsuali antice fortius rotundato, in latere utrinque spinis duabus appropinquantibus armato, anteriore minore, foras directa, altera duplo majore, foras, retro et sursum directa: postice spinis duabus acutis, hac paullo brevioribus instructa: supra flavo, ocellis, spinis et maculis nigris, subtus nigro, dense flavo-maculato. — ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

8. *G. insulana*. — Long. 9—10 millim. (♀).

Nigra, pedibus ferrugineo-sub-annulatis, abdomine transverso, supra flavo-testaceo, vittis duabus transversis, medio conjunctis, anteriore inaequali, in medio dilatata: scuto dorsuali fusiformi-parallelogrammo, postice fortius rotundato spinis duabus parvis utrinque in angulis instructo: parte postica spinis duabus paullo majoribus, sub-divaricantibus armata. — ♀ ad. —

Var. β. pedibus totis nigris, vitta posteriore abdominis parum expressa. — ♀ ad.

Patria: *Gallopagos ins.*, KINBERG.

9. *G. mammeata*. — Long. 8—11 millim. (♀).

Opaca, cephalothorace nigro, parte cephalica supra rubra, vitta media ad longitudinem dueta nigra; pedibus sub-ferrugineis, nigro-annulatis; abdomine cinereo-testaceo, parum latiore quam longiore, antice fortiter rotundato, ex lateribus et postice procursum sex breves, fere cylindratos, apice truncatos, in superficie apicis spina parva armatos emittente. — ♀ ad.

Patria: *Manilla*.

10. *G. guttata*. — Long. c:a 5 millim. (♀).

Sub-nitida, cephalothorace nigro, parte cephalica rubra, fascia media nigra, pedibus testaceis, fusco-annulatis; abdomine ferrugineo-testaceo, maculis marginalibus minoribus antice duabusque, majoribus, rotundatis, dorsualibus, albis: longitudine fere dimidio

latiore, antice fortiter rotundato, angulis sex lateralibus et posticis tuberculo minore, granulato, in medio dente parvo armato instructis. — ♀ ad.?

Patria: *Malacca*, KINBERG.

11. *G. horrens*. — Long. c:a 8 millim. (♀).

Nigra, pedibus sordide testaceis, fusco-lineatis annulatisque, abdomine sub-transverso, supra testaceo-fusco, antice fortiter angulato-rotundato, scuto dorsuali postice leviter tantum rotundato, in latere utrinque spinis duabus appropinquantibus, divaricantibus, oblique foras et sursum directis armato; anteriore tenui, subulata, sat parva, altera duplo majore, a basi versus vicinitatem apicis parum angustata et tum conice amminata: parte postica sat angusta, brevi, spinis duabus mediocribus, subulatis, divaricantibus, libratis armata. — ♀ ad.

Patria: *Assam*.

12. *G. minax*. — Long. c:a 8 millim. (♀).

Nigra et sub-testacea, cephalothorace nigro, pedibus fusco-testaceis, abdomine lurido, sub-transverso, scuto dorsuali antice posticeque fortiter rotundato, utrinque spinis duabus brevioribus, crassis, conicis, anteriore minore, inter se proximis, sub-erectis armato: parte postica spinas duas divaricantes, majores emittenti. — ♀ ad.

Patria: *Nova Hollandia (Sidney)*, KINBERG.

13. *G. parvula*. — Long. c:a $2\frac{3}{4}$ millim. (♂).

Nigro-fusca, pedibus sordide testaceis, nigro-sub-annulatis; abdomine transverso, stellato-ovali, fere plano, flavo-testaceo, nigris maculis, antice modice rotundato, in lateribus et postice quinque rotundato-emarginato, angulis triangularibus, fere æque inter se distantibus, apice mucrone minutissimo instructis; ventre nigro, maculis duabus flavis. — ♂ ad.

Patria: *Singapore*, KINBERG.

14. *G. tuberosa*. — Long. c:a $7\frac{1}{2}$ millim. (♀).

Cephalothorax niger, parte cephalica supra fusco-rufescenti, pedibus rufescentibus, nigro-sub-annulatis; abdomen transversum, supra testaceo-fuscum, granulatum, scuto dorsuali antice posticeque late truncato, in latere utrinque emarginato, angulis quattuor rotundatis, in tubera crassa, alta, tuberculata, dente erecto armata incrassatis; parte postica tuberibus duobus minoribus, libratis dente armatis, instructa. — ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

15. *G. tabulata*. — Long. 7—8 millim. (♀).

Cephalothorax niger, parte cephalica rubra; pedes nigri, femoribus anterioribus annulisque rubris; abdomen transversum, supra luteo-flavum, subtus nigricans, ferrugineo-maculatum, scuto dorsuali magno, transverse rectangulo, spinis quattuor minoribus,

sub-libratis in angulis armato: parte postica brevissima, ea quoque spinis talibus duabus, paullo divaricantibus instructa. — ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

16. *G. modesta*. — Long. c:a 4 millim. (♂).

Rufo-vel ferrugineo-fusca, pedibus rufescenti-annulatis, abdomine transverso, supra fusco vel cupreo, scuto dorsuali subrectangulo, postice parum angustiore, antice posticeque truncato, lateribus rectis, angulis rotundatis, dente parvo, obliquo armatis: parte postica brevissima, sat lata, dentibus ejusmodi duobus, subparallelis armata. — ♂ ♀ ad.

Patria: *Caffraria*, WAHLBERG.

(Forts.)
